

INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA

S APLIKÁCIOU BOTULOTOXÍNU

- Bol(a) som dostatočne informovaný(á) o použití, indikáciách, kontraindikáciách a možných nežiadúcich účinkoch botulotoxínu
- Otvorene a pravdivo som zodpovedal(a) všetky otázky týkajúce sa môjho zdravotného stavu a taktiež som svojho ošetrojúceho lekára informoval(a) o všetkých predchádzajúcich esteticko - chirurgických zákrokoch v mieste dnešnej aplikácie.
- Bolo mi umožnené položiť všetky otázky ohľadne ošetrovania, ktoré ma zaujímali a dostal(a) som dostatočne uspokojivé odpovede.

Beriem na vedomie, že botulotoxín (Alluzience) obsahuje:

- 125 Speywoodových jednotiek hemagglutinínového komplexu toxínu baktérie Clostridium botulinum typ A v 0.625ml roztoku
- pomocné látky:
 - L - histidín
 - Sacharóza
 - chlorid sodný
 - polysorbát 80
 - k.chlorovodíková na úpravu pH
 - voda na injekcie
- Účinok trvá v priemere 3- 6 mesiacov (dĺžka závisí od metabolizmu každého pacienta)

Bola som oboznámená s odporúčaniami po aplikácii a zaväzujem sa ich dodržiavať.

- Ošetrovanými svalmi pohybovať (napr. krčiťčelo, mračiť a usmievať sa) počas 2h od zákroku
- Aby v blízkosti ošetrovaného miesta nedošlo k rozptylu injekčne aplikovaného botulotoxínu:
 - ošetrované miesto nemasírovať , neškriabať , netrieť
 - na tvár si nenasadzovať tesné okuliare (plavecké, lyžiarske) , čiapku či tesnú čelenku
 - 4 - 6 hodín si nesmiete ľahnúť do vodorovnej polohy či sa predkláňať
- **Dva dni** sa vyhnúť alkoholu, nadmernej fyzickej aktivite, wellnesu.
- Návštevu kozmetičky, sauny, solária, masáž tváre či laserové ošetrovanie odporúčame najskôr **týždeň po ošetrovaní** botulotoxínom.
Zvýšené prekrvenie aplikovanej oblasti môže spôsobiť vylúčenie botulotoxínu a tým znížiť jeho efekt.

Bežnou reakciou na ošetrovanie je vznik začervenania, opuchu, modriniek, svrbenia či bolesti v miestach vpichu, ktorá vymizne spontánne po 2 - 4 dňoch bez akejkoľvek liečby. V ojedinelých prípadoch môže tiež nastať bolesť hlavy trvajúca 24-48 hodín od aplikácie.

O všetkých nežiadúcich účinkoch pretrvávajúcich dlhšie ako 1 týždeň musí klient **informovať svojho ošetrojúceho lekára.**

Bola som informovaná (ý) s kontraindikáciami aplikácie botulotxínu:

1. Tehotenstvo a dojčenie
2. Infekcia/zápal v príslušnej lokalite vpichu (herpes, akné ...)
3. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
4. Neuromuskulárne ochorenia (Myastenia gravis , Lamber- Eastonov syndróm ai.), autoimunitné ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi
5. Lieky
 - svalové relaxanciá tubokurarínového typu
 - lieky na srdечnú arytmiu
 - antibiotika
6. Vek (ideálne rozmedzie pre aplikáciu 18-65 r.)

Uvedené skutočnosti a vysvetlenia som pochopil(a) a po dôkladnom zvážení požadujem aplikáciu botulotoxínu.

Meno pacienta :

Meno lekára :

Dátum a podpis pacienta:

Dátum, podpis a pečiatka lekára: